

**Д.В. Золотов, Г.С. Таран. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ**

D.V. Zolotov, G.S. Taran. FLORISTIC RECORDS IN ALTAISKIY KRAY

В ходе исследований, проведенных в 2002-2007 гг. в Быстроистокском р-не Алтайского края, выявлено 3 вида, новых для края, и обнаружены новые местонахождения 19 редких видов. Гербарные материалы хранятся в ALTB и NS. Виды, впервые приводимые для Алтайского края, помечены звездочкой (*).

Potamogeton friesii Rupr.: 1) окрестности с. Быстрый Исток (далее – Б. Исток), оз. Ивановское, на мелководьях, 5.VII 2002, Д. Золотов (далее – Д.З.), Е. Мунгалов (далее – Е.М.), Д. Черных (далее – Д.Ч.); 2) окрестности с. Верх-Озерное, оз. Завьялово, в воде, 3.VII 2003, Д.З., Д.Ч., И. Андреева. (ALTB). – Четвертая и пятая находки вида в крае. Ближайшие местонахождения располагаются в 80 км на юго-восток в Алтайском р-не и в 110 км на северо-запад у г. Барнаул (Дурникин, 2003).

P. praelongus Wulfen: окрестности с. Верх-Озерное, оз. Завьялово, в воде, 1.VII 2002, Д.З., Е.М. (ALTB). – Ранее собирался на юго-западе края (Дурникин, 2003). Ближайшие местонахождения располагаются на расстоянии более 200 км. Для поймы Оби приводится впервые.

Digitaria ischaetum (Schreb.) Muehl.: 1) 4 км на юг от с. Б. Исток, полевая дорога, на песке, 1.VIII 2007, Г. Таран (далее – Г.Т.); 2) 7 км на запад от с. Б. Исток, полевая дорога у берега Оби, на песке, 25.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н.; 3) окрестности с. Верх-Озерное, сосновый борок, на песках у дороги, 27.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н. (NS, ALTB). – До этого в крае были известны три находки, ближайшая была сделана в 75 км на юго-восток у с. Алтайское (Эбель, Эбель, 1997; Ломоносова, 2003; Силантьева, 2006).

Stipa pulcherrima K. Koch: окрестности с. Приобское, Опёнышев лог, степной склон, 4.VII 2002. Д.З., Е.М., А. Поляков (далее – А.П.), Д.Ч., И. Андреева, С. Циликина. (ALTB). – Вторая находка в крае. Ранее собирался в Краснощёковском р-не (Ломоносова, 2003).

Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad.: 7 км на запад от с. Б. Исток, берег Оби, илисто-песчаная отмель, 24.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н. (ALTB). – Ранее собирался в бассейне р. Алей в 200-220 км юго-западнее (Ломоносова, 2003).

C. schoenoides (L.) Lam.: 8 км на восток от с. Б. Исток, берег Оби, илисто-песчаная отмель, 23.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н. (NS, ALTB). – Основные находки вида приходятся на юго-запад Алтайского края (Ломоносова, 2003). Ближайшие местонахождения расположены в 120 км к юго-западу в Чарышском р-не и в 80 км на север-северо-запад в Первомайском р-не (Таран и др., 2007).

**Scirpus ehrenbergii* Voeckeler: окрестности с. Б. Исток, р. Обь, о. Сосновый, склон межгрядного понижения, на илисто-песчаном грунте, 17.IX 2007, Г.Т. (NS). – Ближайшие находки в Западной Сибири сделаны в пойме Иртыша (Свириденко и др., 2001).

S. lateriflorus J.F. Gmel.: 7 км на запад от с. Б. Исток, сырой участок дороги в пойме Оби, 25.VIII 2007, Д.З., Г.Т., А.Н. (ALTB). – Четвертая находка в крае. Ближайшее местонахождение – пойма Оби у г. Барнаул (Красноборов, 2003; Таран и др., 2007).

Eleocharis ovata (Roth.) Roem et. Schult.: 7 км на запад от с. Б. Исток, берег Оби, илисто-песчаная отмель, 24.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н. (ALTB). – Ранее собирался в Первомайском р-не и нижнем течении р. Бия (Красноборов, 2003; Силантьева, 2006).

Carex chordorrhiza Ehrh. ex L. f.: окрестности с. Акутиха, оз. Малое Камышное, сфагновое болото, 8.VII 2002, Д.З., Е.М., Д.Ч., А.П. (ALTB). – Собирался В.И. Верещагиным в окрестностях Барнаула в 1912 г. (Красноборов, 2003; Силантьева, 2006).

Listera ovata (L.) R. Br.: 1) окрестности с. Восход, болото Мореодское, березовая согра, 6.VII 2002, Д.З., Е.М., Д.Ч., А.П.; 2) окрестности с. Приобское, болото Источное, разнотравные ивово-березовые заросли по его окраине, 2.VII 2002, Д.З., Е.М., А.П.; 3) окрестности с. Приобское, березняк кустарниково-ежевичный, 30.VII 2007, Г.Т. (NS, ALTB). – До этого в крае были известны три находки: ранее отмечен в Курьинском и Первомайском районах и у г. Барнаул (Шауло, 2003; Маслова, 2003).

**Polygonum calcatum* Lindm.: с. Б. Исток, в огороде, 30.VII 2005, Д.З., Д.Ч. (ALTB).

**P. rigidum* V. Skvorts.: окрестности с. Восход, оз. Мореодское, пески по обочине дороги, 13.VIII 2002, Е.М., А.П., Д.Ч. (ALTB).

Sagina saginoides (L.) H. Karst.: 7 км на запад от с. Б. Исток, берег Оби, илисто-песчаная отмель, 24.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н. (ALTB). – Четвертое местонахождение в крае. Ранее собирался в Курьинском и Чарышском районах и у г. Барнаул (Красноборов, 2003).

Otites baschkirorum (Janisch.) Holub: окрестности с. Усть-Ануй, Красная горка, каменистые отвалы на месте разработок гранита, 2.VII 2002, Д.З., Е.М. (ALTB). – Очень редок; собирался в Ключевском, Кулундинском и Локтевском районах (Красноборов, 2003; Маслова, 2003).

Ranunculus gmelinii DC.: 1) окрестности с. Акутиха, урочище Мысы, ивово-березовая согра с *Calla palustris*, 16.VII 2007, Д.З., Д.Ч., А.Г. Вотинов; 2) окрестности с. Восход, на окраине заболоченных зарослей *Salix cinerea*, 27.VIII 2007, Д.З., Г.Т., А.Н. (ALTB). – Указан для Красногорского, Мамонтовского, Чарышского районов и г. Барнаул (Куцев, 2003), причем не собирался на территории края длительное время (Силантьева, 2006).

Viola prionantha Bunge: окрестности с. Б. Исток, пойма Оби, о. Сосновый, луг в прирусловой зоне, 18.VIII 2007, Г.Т. (NS). – Ранее собирался в нижнем течении р. Катунь (Никитин, Силантьева, 2006).

Oenothera rubricaulis Klebahn: окрестности с. Верх-Озерное, оз. Завьялово,

суходольный луг по берегу озера, 4.VII 2002, Д.З., Е.М., Д.Ч., А.П. (ALTB). – Очень редок; ранее собран у г. Барнаул (Силантьева, 2006).

Centaureum meyeri (Bunge) Druce: окрестности с. Б. Исток, выпасаемый луг у дороги между селами Б. Исток и Приобское, 24.VII 2007, Г.Т. (NS). – Распространен на юго-западе края. Ближайшие местонахождения располагаются в 200 км западнее в Новичихинском и Егорьевском районах (Шауло, 2003; Силантьева, 2006).

Cuscuta approximata Vab.: окрестности с. Приобское, Опёнышев лог, на степном склоне на растениях *Medicago falcata* и *Artemisia gmelinii*, 10.VIII 2006, Д.З., Д.Ч. (ALTB). – Ранее собирался в Змеиногорском (Ломоносова, 2003) и Третьяковском (Клещева и др., 2005) районах.

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox: 1) 8 км на восток от с. Б. Исток, берег Оби, илесто-песчаная отмель, 23.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н.; 2) 7 км на запад от с. Б. Исток, берег Оби, илесто-песчаная отмель, 24.VIII 2007, Г.Т., Д.З., А.Н.; 3) там же, сырой участок дороги на пойме, 25.VIII 2007, Д.З., Г.Т., А.Н. (NS, ALTB). – До этого в крае были известны четыре находки, ближайшая была сделана в нижнем течении р. Бия у с. Стан-Бехтемир (Косачев, 2003; Таран и др., 2007).

Utricularia minor L.: 1) окрестности с. Акутиха, оз. Малое Камышное, сфагновое болото, 8.VII 2002, Д.З., Е.М., Д.Ч., А.П.; 2) окрестности с. Приобское, болото Источное, осоковое болото с березой пушистой и ивами, 2.VII 2003, Д.З., Д.Ч., А.В. Салтыков. (ALTB). – Ранее собирался значительно севернее, у г. Барнаул и в смежных с ним районах – Калманском, Павловском, Тальменском, Шелаболихинском (Дурников, 2003).

Полевые работы в 2007 г. финансировались средствами гранта МСОП № КАА040 в рамках проекта «Стратегия сохранения растений Алтае-Саянского экорегиона».

Л и т е р а т у р а : Дурников Д.А. Рода *Utricularia* L., *Potamogeton* L. // Определитель растений Алтайского края. Новосибирск, 2003. С. 368–369, 476–481. – Клещева Е.А., Королюк А.Ю., Лацунский Н.Н. Флористические находки в Новосибирской области и на юге Алтайского края // Turczaninowia. 2005. Т. 8. № 2. С. 30–34. – Косачев П.А. Род *Lindernia* All. // Определитель растений Алтайского края. Новосибирск, 2003. С. 353. – Красноборов И.М. Рода *Sagina* L., *Otitis* Adans., *Scirpus* L., *Eleocharis* R. Br., *Carex* L. // Там же. 2003а. С. 89, 97–99, 517–519, 521–522, 522–542. – Куцев М.Г. Род *Ranunculus* L. // Там же. 2003. С. 67–72. – Ломоносова М.Н. Рода *Cuscuta* L., *Stipa* L., *Crypsis* Aiton, *Digitaria* Hall. // Там же. 2003а. С. 331–332, 577–579, 581–582, 583. – Маслова О.М. Конспект флоры западных низкогорий Алтая // Ботан. исслед. Сибири и Казахстана: Сб. науч. тр. Барнаул, 2003. Вып. 9. С. 3–50. – Никитин В.В., Силантьева М.М. Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) Алтайского края // Нов. сист. высш. раст. 2006. Т. 38. С. 165–201. – Свириденко Б.Ф., Зарипов Р.Г., Бекишева И.В., Свириденко Т.В. Флористические находки в Омской области // Бот. журн. 2001. Т. 86. № 1. С. 153–156. – Силантьева М.М. Конспект флоры Алтайского края. Барнаул, 2006. 392 с. – Таран Г.С., Силантьева М.М., Шибанова А.А. Флористические находки в поймах реки Оби и ее притоков (Алтайский край) // Бот. журн. 2007. Т. 92. № 11. С. 1763–1768. – Шауло Д.Н. Рода *Centaureum* Hill, *Listera* R. Br. // Определитель растений Алтайского края. Новосибирск, 2003а. С. 320–321, 506. – Эбель А.Л., Эбель Т.В. Флористические находки в Алтайском крае // Ботан. исслед. Сибири и Казахстана: Сб. науч. тр. Барнаул, 1997. Вып. 3. С. 39–41.